



Consentimiento Para Donantes Menor de Edad

Atención Padres o Guardián:

Por este medio doy mi consentimiento para que mi niño menor, que es por lo menos 16 años de edad, done su sangre o componentes de sangre a Gulf Coast Regional Blood Center.

Marque uno de los siguientes:

- Yo deseo honrar la privacidad de mi niño menor sobre la información de salud protegida; por lo tanto, yo renuncio mi derecho del acceso a cualquier resultado de pruebas o otra información de salud protegida que Gulf Coast Regional Blood Center puede obtener o mantener con respecto al estado de la salud de mi niño. Aun más, yo por este medio doy mi consentimiento para mi niño a controlar acceso a su información de salud protegida que es mantenida en Gulf Coast Regional Blood Center.

- Yo solicito que Gulf Coast Regional Blood Center me proporcione con cualquier anormal resultado de pruebas o otra información de salud protegida que puede ser obtenida o mantenida con respecto al estado de la salud de mi niño.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Nombre de Padre/Guardián (impresión): | Fecha: / / |
| Firma de Padre/Guardián: | |

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| Nombre Legal Completo del Menor (impresión): | Fecha: / / |
| Fecha de Nacimiento: / / | |



Gulf Coast Regional Blood Center

1400 La Concha Lane, Houston, TX 77054
www.giveblood.org • 1-888-482-5663

Información General Sobre Donación de Sangre

Gulf Coast Regional Blood Center hace una determinación en cuanto a la elegibilidad de todos los donantes de sangre basada en un examen físico (chequeo de salud), entrevista de donante, y prueba de enfermedades. Durante la entrevista, información sensible y personal es obtenida del donante.

La Elegibilidad del Donante de Sangre

Nuestra consideración mas importante es la seguridad del donante y del paciente que quizás recibirá la transfusión de sangre. Los pasos en el proceso de donación de sangre incluyen:

- Requisitos básicos del donante:
 - Tener por lo menos **16 años de edad** a la fecha de la donación
 - **Pesar por lo menos 110 lb, o 122 lb para los donantes de 16 años edad**, a la fecha de la donación
 - **Comer una comida bien balanceada antes de donar**
 - **Beber suficientes líquidos antes de donar**
- Traer **una identificación válida** con fotografía antes de donar.
- La elegibilidad del donante será establecida en una entrevista confidencial. Esta entrevista incluye preguntas acerca de la historia médica y actividades del donante, que le puede exponer a una persona a agentes contagiosos tales como los virus que causa VIH/SIDA, la hepatitis, o el virus del Nilo Occidental (WNV).
- Verificar el ritmo del corazón del donante, la temperatura, la presión, y el nivel de hemoglobina (la proteína que carga el oxígeno en los glóbulos rojos).
- Utilizar equipo nuevo, estéril y desechable para sacar aproximadamente una pinta de sangre.
- Descansar y merendar después de donar.
- Hacer pruebas para la hepatitis B y C, para Chagas, para WNV, para VIH, para ciertas otras enfermedades contagiosas, y para la sífilis.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestras pruebas o para una lista completa de pruebas realizadas, favor de contactar a los Servicios Médicos al 713-791-6612 o a la Doctora Susan Rossmann al 713-791-6275.

Para reportar algún asunto subsiguiente relacionado a su donación, favor de contactar al Gulf Coast Regional Blood Center al 713-790-1200.

Reacciones Adversas al Donar Sangre

El proceso de donación de sangre es normalmente una experiencia agradable, es posible que efectos secundarios a corto plazo puedan ocurrir tal como el mareo, la irritación de la piel, magullar, o desmayar. Aunque improbable, es también posible magullar alrededor de la vena, una infección, o daño al nervio puede desarrollarse durante o después de su donación. En raras ocasiones, reacciones más severas pueden ocurrir con complicaciones que son más graves.

Para prevenir el comienzo de una reacción adversa, es importante que usted siga las recomendaciones de descansar, beber jugo, y merendar un bocado inmediatamente después de su donación. Además, comiendo una comida completa dentro de las 4 horas antes de su donación lo ayudará a sentirse fuerte después de donar; bebiendo agua y jugos antes de y después de donar, ayudara su cuerpo a reponer los líquidos perdidos.